

■ Come Sostenerci

È possibile sostenere le attività della Fondazione Foemina Onlus con libere contribuzioni deducibili dalla propria dichiarazione dei redditi tramite:

Bonifico:

Banca CR Firenze

IBAN IT50 D0616002 9990 0000 1025 C00

Conto corrente postale 86082294 intestato a Fondazione Foemina Onlus

Online mediante PayPal sul sito:

www.fondazionefoemina.it

Conservare la ricevuta di pagamento.

Attraverso tali forme di versamento è possibile godere delle agevolazioni fiscali, conservando con cura l'attestazione di pagamento.

Si può inoltre contribuire fattivamente agli scopi dell'ente, entrando a far parte della Fondazione Foemina, in qualità di Fondatore, Partecipante o Amico della Fondazione, ipotesi regolate dallo statuto agli art. 6, 7 e 8, consultabile sul sito della Fondazione.

■ Missione e obiettivi

Sempre più spesso in medicina, ed in particolare nel settore dedicato all'assistenza, si pone l'esigenza di servizi di alta qualità che incentrino l'attenzione sulla persona.

La **Fondazione Foemina** pone al centro dell'attenzione la donna e il neonato.

Missione della **Fondazione Foemina** è, accanto al miglioramento dell'assistenza, della ricerca e della formazione, la realizzazione di servizi per il benessere della donna e del neonato, attraverso una nuova cultura della salute e della prevenzione.

**FONDAZIONE FOEMINA
ONLUS**

**50122 Firenze
Via Por Santa Maria, 8**

**T. 055 2638682
F. 055 2306770**

**box@fondazionefoemina.it
www.fondazionefoemina.it**

Fondazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Firenze, n°398



papillomavirus LO SAI..?



foemina

FONDAZIONE PER LA MATERNITÀ E LA
SALUTE DELLA DONNA E DEL NEONATO
ONLUS

In collaborazione con:
Assessorato all'Educazione

Che cosa è il Papillomavirus umano o HPV?

L'Hpv (Human Papilloma Virus) è un'infezione virale a trasmissione sessuale molto diffusa **in entrambi i sessi**.

Tra i tanti tipi di Papillomavirus umano, alcuni sono responsabili di infezioni alle mucose genitali e, tra questi, circa 15 possono dare luogo allo sviluppo di tumori.

I tipi di Papillomavirus che infettano i genitali femminili sono classificati in due gruppi:

- **ad alto rischio**, ad esempio i tipi 16 e 18, responsabili del cancro del collo dell'utero e, più raramente, della vagina, della vulva e dell'ano;
- **a basso rischio**, ad esempio i tipi 6 e 11, responsabili dei condilomi (o verruche) genitali.

Come si trasmette il Papillomavirus umano?

Il Papillomavirus umano si trasmette principalmente per **via sessuale**, anche tramite semplice contatto nell'area genitale.

Quanto è diffuso il Papillomavirus umano?

E' stato stimato che **più del 70% della popolazione** entra in contatto con il virus nel corso della propria vita. La maggior parte delle persone è portatrice senza saperlo e, nel 90% dei casi, non si svilupperà malattia, poiché l'infezione verrà eliminata spontaneamente attraverso una risposta immunitaria adeguata.

In alcuni casi, però, il virus è in grado di rimanere all'interno delle cellule della mucosa genitale, favorendo la trasformazione della cellula ospite da normale a tumorale.

Quanto è diffuso il cancro del collo dell'utero?

Il cancro del collo dell'utero rappresenta una delle forme tumorali più diffuse nella popolazione femminile, con un'incidenza di **10 su 100.000** donne di tutte le età, secondo solo al cancro del seno.

L'infezione persistente di Papillomavirus umano ad alto rischio è la condizione necessaria (anche se non sufficiente) per lo sviluppo del cancro del collo dell'utero.

Quali altre patologie possono essere causate dal Papillomavirus umano?

Il Papillomavirus umano può causare altre patologie, anche se con incidenza inferiore a quella del cancro del collo dell'utero:

- cancro della vulva e della vagina
- cancro dell'ano
- cancro del pene
- cancro della faringe e del cavo orale

Alcuni tipi di virus a basso rischio sono responsabili, invece, di un disturbo molto diffuso: i condilomi genitali.

Cosa sono i condilomi ?

I condilomi acuminati, chiamati anche verruche anogenitali o "creste di gallo", sono particolari forme di **verruche provocate nel 90% dei casi da Papillomavirus** di tipo 6 o 11. Si tratta di lesioni della mucosa genitale molto contagiose che possono essere trattate a livello ambulatoriale.

Il Tuo 5X1000 alla Fondazione Foemina

Chiunque sia tenuto in qualità di contribuente a presentare la dichiarazione dei redditi sulle persone fisiche, mediante i modelli 730, Unico o Cud. Nel riquadro Settore Onlus, riportare il seguente codice fiscale: **05715200480**

Come viene diagnosticato il cancro del collo dell'utero?

Il **PAP test** (striscio cervicale) è un modo semplice ed efficace per individuare precocemente eventuali anomalie cellulari del collo dell'utero provocate dal Papillomavirus.

E' possibile effettuare il PAP test presso le strutture ospedaliere, gli ambulatori, i consultori o il proprio ginecologo.

Il cancro del collo dell'utero può essere trattato con successo nella quasi totalità dei casi, se diagnosticati in tempo.

E' possibile prevenire un'infezione da Papillomavirus?

Oggi è possibile una prevenzione primaria del Papillomavirus grazie al **vaccino**.

Il vaccino protegge dall'infezione dei tipi più diffusi di Papillomavirus, impedendo la formazione di alterazioni cellulari che nel tempo potrebbero diventare tumorali.

Ricorda che...

- Il vaccino anti Papillomavirus non cura il cancro del collo dell'utero, i condilomi genitali o altre patologie correlate al virus, ma li previene
- Il vaccino non sostituisce la prevenzione attuata mediante PAP test.

E' necessario comunque sottoporsi a PAP test anche se si è vaccinati, poiché altri tipi di Papillomavirus, non inclusi nel vaccino, possono provocare infezione.